

Aszkuszos vagy tömlős gombák törzse – *Ascomycota*
osztály – *Lecanoromycetes*

Tölcséruzumó vagy serlegzumó– *Cladonia pyxidata*

Hamuszürke vagy sárgászöld telepei sok más zumó színétől nem sokban különböznek, azonban a felfelé szélesedő tölcsérszerű képleteiről ezt az alakkört könnyű felismerni.

A tölcsér- vagy serleg-alakú képlet a zumóban együttélő gomba-partner termőtestét emeli magasba, ezt a képletet podéciumnak (latinul podetium) szokták nevezni. A podéciumok ennéel a fajnál rendszerint 1-4 cm magasak.

A tölcséres zumók altelepe egyes fajoknál erősen redukált, más fajok esetében (mint *Cladonia pyxidata*) levelesen sallangos, 2-5 mm-es telepkaréjokkal. Egyes fajoknál a levélszerű telepkaréjok a podécium külső oldalán is megtalálhatók.

Hasonló felépítésű zumófajok a nemzetségen belül még nagy számban vannak, ezek elkülönítése morfológiai, élőhelyi és ökológiai igényeik figyelembe-vétele mellett mikroszkópos bélyegek és vegyi anyagokkal történő színreakciók alapján lehetséges csak.

Tápanyagban szegény és fényben gazdag helyeken fordul elő. Hegy- és dombvidékeink üde- és mészkerülő erdeiben gyakoribb, síkvidékeken ritkább előfordulású. Kilúgzott talajon, útrézsükben, korhadó és élő fák tövével, korhadó fán él.

